



INDIKATIONER:

- upplösning av struvitstenar
- förebygger återkommande struvit- och kalciumoxalatsten

OBS!

- Vid återkommande idiopatisk cystit (inflammation i urinblåsan av oklart ursprung) rekommenderas Urinary S/O våtfoder.
- Om katten är äldre rekommenderas kontroll av njurfunktionen innan Urinary S/O ordineras.

KONTRAIKATIONER:

- dräktighet, digivning, tillväxt
- kronisk njursvikt, metabolisk acidosis
- hjärtsvikt
- hypertension (högt blodtryck)
- användning av urinförsurande läkemedel


UTFODRINGSANVISNING:

För upplösning av struvitsten krävs 5-12 veckors strikt utfodring med Urinary S/O. För att förebygga återfall bör fodret ges under ytterligare en period på minst 6 månader, följt av en urinprovsanalys. När katten är frisk kan den gå över till något av friskfodren i Vet Care Nutrition-sortimentet.

YTTRELIGARE INFORMATION:

URINARY S/O HIGH DILUTION löser snabbt upp struvitstenar.

I en studie som utfördes in vitro på Royal Canins forskningscenter löstes struvitstenar på 17 dagar.



SAMMANSÄTTNING:

Ris, vetegluten*, köttmjöl (fågel), majs mjöl, animaliskt fett, majs gluten, mineral, cellulosa fiber, hydrolyserat animaliskt protein, fiskolja, sojaolja, frukto-oligosackarider, äggpulver, skaldjurshydrolysat (innehåller glukosamin), tagetesextrakt (innehåller lutein).

*LIP (Low Indigestible Protein): protein med mycket hög smältbarhet.

REKOMMENDERAT DAGLIGT INTAG:

Kattens vikt	Mager		Normal		Övervikt	
	gram	cups	gram	cups	gram	cups
2 kg	35	3/8	30	3/8		
3 kg	55	5/8	40	4/8		
4 kg	70	6/8	55	5/8		
5 kg	90	1	70	6/8	60	6/8
6 kg	110	1 3/8	85	7/8	70	7/8
7 kg			100	1 1/8	85	1
8 kg			115	1 3/8	95	1 1/8
9 kg			128	1 5/8	105	1 2/8
10 kg			145	1 6/8	120	1 4/8

Observera: 1 cup = ca 240 ml



Urinary S/O High Dilution säkrar en effektiv upplösning av struvitstenar.



En ökad urinvolymer leder till att urinen får en lägre koncentration av struvit- och kalciumoxalatkrystaller, vilket bidrar till minskad risk för utvecklingen av den här sortens urinsten. En större urinvolymer säkrar en regelbunden tömning av urinblåsan.



En reducerad mättnadsgrad i urinen innebär att kristaller inte bildas lika lätt och därmed förebyggs urinstenar som struvit och kalciumoxalat.



Magnesium ingår som komponent i struvitstenar. Med ett lågt magnesiuminnehåll minskar risken för bildning av struvitkristaller.



400 g, 1.5, 3.5 och 6 kg



Naturlig storlek

NYCKELTAL (per 100g torrfoder):

Protein:	34.5 g
Fett:	15 g
Kolhydrat:	32.8 g
Stärkelse:	28.8 g
Kostfiber:	6.8 g
Växttråd:	2.8 g
Omega 6:	3.42 g
Omega 3:	0.71 g
EPA+DHA:	0.36 g
Kalcium:	0.9 g
Fosfor:	0.9 g
Klorid:	2.38 g
Magnesium:	0.05 g
Kalium:	1 g
Natrium:	1.3 g
Kondroitin + glukosamin:	176.5 mg
Omsättbar energi*:	404.2 kcal

*Beräknat energiinnehåll enligt Atwaters ekvation (NRC 74).

Samverkande antioxidantkomplex:

Vitamin E:	50 mg
Taurin:	210 mg
Lutein:	0.9 mg