



**INDIKATIONER:**

- urinvägsinfektion
- upplösning av struvitstenar
- förebygger återkommande struvit- och kalciumoxalatsten

*Om hunden är äldre rekommenderas kontroll av njurfunktionen innan Urinary S/O ordineras.*

**KONTRAIKATIONER:**

- dräktighet, digivning, tillväxt
- kronisk njursvikt, metabolisk acidosis
- pankreatit/tidigare pankreatit
- hyperlipidemi (förhöjd halt av blodfetter)
- hjärtsvikt
- användning av urinförsurande läkemedel

**UTFODRINGSANVISNING:**

För upplösning av struvitsten krävs 5-12 veckors strikt utfodring med Urinary S/O. Vid urinvägsinfektion ordineras samtidigt lämplig medicinsk behandling. Urinary S/O ges under minst en månad efter att bakteriologisk analys av urinprovet varit negativ.

**YTTERLIGARE INFORMATION:**

En måttligt förhöjd natriumhalt ger en ökad urinvolym och en utspädning av urinen. Utspädningen tillsammans med surgörning av urinen löser och förebygger effektivt struvitstenar. Samtidigt förebyggs även bildning av kalciumoxalatstenar.

Urinary S/O rekommenderas som förstahandsvalet vid urinsten, innan urinstenen analyserats.

**SAMMANSÄTTNING:**

Ris, majs mjöl, animaliskt fett, köttmjöl (fågel), majs gluten, mineral, hydrolyserat animaliskt protein, cellulosa fiber, sojolja, fiskolja, frukto-oligosackarider, tagetesextrakt (innehåller lutein).

**REKOMMENDERAT DAGLIGT INTAG:**

Vi rekommenderar att det dagliga intaget delas upp på två måltider.

Hundens vikt	mager		normal		övervikt	
	gram	cups	gram	cups	gram	cups
2 kg	65	6/8	55	5/8	40	3/8
4 kg	110	1 2/8	90	1	65	6/8
6 kg	150	1 5/8	120	1 2/8	90	1
8 kg	185	2	150	1 5/8	110	1 2/8
10 kg	220	2 3/8	175	1 7/8	130	1 3/8
15 kg	295	3 2/8	235	2 4/8	175	1 7/8
20 kg	360	3 7/8	290	3 1/8	215	2 3/8
25 kg	425	4 5/8	340	3 5/8	255	2 6/8
30 kg	485	5 2/8	390	4 2/8	290	3 1/8
35 kg	545	5 7/8	435	4 6/8	325	3 4/8
40 kg	600	6 4/8	480	5 2/8	360	3 7/8
50 kg	710	7 5/8	565	6 1/8	425	4 5/8
60 kg	810	8 6/8	645	7	485	5 2/8
70 kg	905	9 6/8	725	7 7/8	545	5 7/8
80 kg	995	10 6/8	800	8 5/8	600	6 4/8

Observera: 1 cup = ca 240 ml



Urinary S/O säkrar en effektiv upplösning av struvitstenar. Ett surt urin-pH hämmar bakterietillväxten som ofta ses tillsammans med struvitstenar.



En ökad urinvolym leder till att urinen får en lägre koncentration av struvit- och kalciumoxalatkristaller, vilket bidrar till minskad risk för utvecklingen av den här sortens urinsten. En större urinvolym säkrar en regelbunden tömning av urinblåsan.



En reducerad mättnadsgrad i urinen innebär att kristaller inte bildas lika lätt och därmed förebyggs urinstenar som struvit och kalciumoxalat.



Magnesium ingår som komponent i struvitstenar. Med ett lågt magnesiuminnehåll minskar risken för bildning av struvitkristaller.



2, 7,5 och 14 kg

Naturlig storlek

**NYCKELTAL (per 100g torrfoder):**

Protein:	18 g
Fett:	17 g
Kolhydrater:	46.6 g
Stärkelse:	43.3 g
Kostfiber:	5.6 g
Växttråd:	2.3 g
Omega 6:	3.67 g
Omega 3:	0.58 g
EPA+DHA:	0.2 g
Kalcium:	0.5 g
Fosfor:	0.5 g
Natrium:	1.2 g
Magnesium:	0.05 g
Klorid:	2.21 g
Omsättbar energi*:	411.4 kcal

\*Beräknat energiinnehåll enligt Atwaters ekvation (NRC 74).

**Samverkande antioxidantkomplex:**

Vitamin E:	60 mg
Vitamin C:	20 mg
Taurin:	210 mg
Lutein:	0.5 mg